伊勢湾における生態系構造と生物生産力の変化

愛知県水産試験場 曾根亮太

2010年 豊浜市場

2020年 豊浜市場

伊勢湾と漁獲対象種

1km²あたり年間漁獲量

伊勢湾：約31トン、三河湾：約37トン、遠州灘：約9トン（日本水産資源保護協会2004年推定値より）
瀬戸内海：約21トン（Okaichi and Yanagi, 1997）

伊勢湾における基礎生産力の低下

栄養環境の推移（伊勢湾全域年平均値）

(広域総合水質調査)

2010年以降、基礎生産力が低下

クロロフィルの水平分布（青山・蒲原2022改変）

1990年代

2010年代

湾全域で低下

伊勢湾における基礎生産力の低下

愛知県におけるノリ生産状況

色落ちしたノリ (右)

愛知県におけるアサリ漁獲量の推移

餌不足で痩せたアサリ (右)

(愛知県栄養塩管理検討会議報告書より抜粋)

伊勢湾における水産資源の変化

減少している種

伊勢湾小底金額割合 (1970-2020平均)

2種で伊勢湾小底の全漁獲金額の約30%
(過去は50%を占めることも)

シャコ

マアナゴ

サルエビ

クルマエビ

内湾代表種

マアナゴ・シャコ漁場の変化

マアナゴ
(あなご籠)

2002-2004

2010-2012

2018-2020

シャコ
(小底)

2002-2004

2010-2012

2018-2020

マアナゴ・シャコ肥満度の推移

肥満度（CF）と資源量指標（CPUE）との推移

マアナゴCPUEと肥満度

・肥満度が低いと資源が少ない

・肥満度は経年的に低下傾向

(曾根ら2022ab)

マアナゴ胃内容物組成の変化

空胃率の推移

- 2015年から空胃率が高い傾向

胃内容物組成の変化 (重量比)

- 甲殻類と魚類が重要餌資源
- 2015年から甲殻類の割合が減少

(曽根ら2022a)

マアナゴ・シャコの餌料環境の変化

シャコ・サルエビ類 (豊浜漁獲量)

小型甲殻類 (漁場一斉調査)

ゴカイや二枚貝 (環境省広域総合水質調査)

(曾根ら2022a)

マアナゴ・シャコに対するボトムアップ効果の影響

伊勢湾の栄養環境（伊勢湾南部・春季）

(広域総合水質調査)

(公共用水域水質観測)

基礎生産力の低下
(植物プランクトンの減少)

餌料生物の減少

摂餌量の低下

肥満度の低下

生存率の低下

資源量の減少

伊勢湾における水産資源の変化

増加している種

マダイ

ヒラメ

ハモ

サワラ

大型魚類

マダイ

ヒラメ

2011-2013年

2019-2021年

※外海・内湾のバブルサイズはそれぞれにおける相対値
(曾根ら2023a)

マダイ・ヒラメの資源構造の変化

体サイズ組成

(市場調査年合計)

伊勢・三河湾で大型化
(ちなみにマダイ50cm:約15歳)

(曽根ら2023a)

餌資源と大型魚類の分布域のシフト

Chl.a水平分布

2000年代夏季

2010年代夏季

(加藤未発表)

シャコ

2010-2012年

2018-2020年

(曾根ら2022)

カタクチイワシ

2010-2014年 (7月)

2015-2019年 (7月)

(下村未発表)

2010年以降
基礎生産力が低下

重要餌資源

水産資源の分布域の変化によって
伊勢湾の漁獲物組成が変化

伊勢湾における生態系構造と生物生産力の解析

漁獲物組成の変化（小底主要港主要12種）

長期漁獲データ（伊勢湾小底1970-2020年）により、生態系構造と生物生産力を解析

生態系構造の把握

各年の魚種別漁獲量の類似性を解析：Bray-Curtis指数
(比較対象として渥美外海漁獲データも使用)

クラスター分析(Ward法)

年代ごとに一定のまとまりとなる

非計量多次元尺度法 (nMDS)

伊勢湾の漁獲物組成は外海に近づいている

(曾根・日比野、印刷中)

生態系構造の把握

平均栄養段階 (MTL) と多様度指数 (Shannon-Wiener: H')

'70-'90 : シャコ・小型クルマエビ中心
 '80-'10 : スズキ・マダコ等増加
 '10-'20 : シャコ等減少・マダイ等増加

→ MTLも多様度も低い
 → MTLも多様度も上昇
 → MTLはさらに上昇、多様度はやや低下横ばい

(曽根・日比野、印刷中)

生物生産力の解析

漁獲対象の生物生産力
(= 各生物が持つ増える力)

$$FPI = \sum_i^{20} CPUE_i \times P/B_i$$

漁業生物生産指数 (FPI) の推移

2010年以降、減少

(曾根・日比野、印刷中)

漁業生物生産指数 (FPI) :
構成する種の資源量 (CPUE) と生産効率 (P/B比) による
(漁獲量上位20種の総和)

生態系構造と生物生産力の変動要因の解析

生態系構造 (MTL) と生物生産力 (FPI) に対する
水温及び全リン (基礎生産力の指標) の影響を解析

MTL/FPIに対するTP/水温のラグ相関

Water quality	Lag (year)	MTL	FPI
TP	0	-0.34*	0.29
	-1	-0.43**	0.51**
	-2	-0.51**	0.38*
	-3	-0.32*	0.33*
Water Temperature	0	0.46**	0.07
	-1	0.43**	-0.21
	-2	0.48**	-0.20
	-3	0.25	-0.03

MTLの上昇はTP低下と水温上昇に関連がある
FPIの低下はTPの低下にのみ関連がある

生態系の構成種は基礎生産だけでなく水温の影響も受ける。一方、生物生産力は基礎生産力の影響が大きい。

生態系構造と生物生産力の変動要因の解析

1982-2020

全期間を対象とすると、
FPIは1~3年前のTPの影響を受けている

1982-2009

シャコ等低次生物が漁獲主体であった過去
・ FPIは1年前のTPの影響が大きい

2009-2020

マダイ等高次生物が漁獲主体となった現在
・ FPIは3年前のTPの影響が大きい

(曾根・日比野、印刷中)

伊勢湾における生態系構造と生物生産力の解析

三大湾での水産資源の変動と生態系構造の変化を比較

他の内湾ではどうか？

各湾主要漁協における漁獲統計資料（1980～2021年）を使用

小型底びき網（板びき）

(1980-2009)

・神奈川県農林水産統計から
東京湾海域地区抽出

(2012-2021)

・小型底びき網（ビーム）

小型底びき網
（板びき、石げた）

三大湾における主要水産資源の変動

漁獲量
(t)

(曽根ら2023b)

三大湾の生態系構造の比較

平均栄養段階 (MTL) の推移

各湾MTLの相関係数 (***) : $p < 0.01$

	伊勢湾	東京湾	大阪湾 (板びき)	大阪湾 (石桁)
伊勢湾	—	***	***	***
東京湾	0.85	—	***	***
大阪湾 (板びき)	0.69	0.80	—	***
大阪湾 (石桁)	0.57	0.66	0.74	—

東京湾や大阪湾も伊勢湾と
同様の生態系構造の変化が生じている

伊勢湾における漁業経営への影響

漁業者への影響はどうか？

伊勢湾小型底びき網漁業における損益分岐点の年代比較

損益分岐点は上昇 (固定費：減価償却・修繕費等、変動費：燃油代等)

大型魚類狙いにより航行距離が増加

まとめと課題

内湾資源の変動要因 (イメージ)

伊勢・三河湾における課題

- 生産力の回復に向けた取り組み
- ・ 栄養塩管理運転
 - ・ 環境基準の見直し